

VÄSTERHAVSVECKANS ALGBINGO

FOTO: BJÖRN KÄLLSTRÖM/GMBL




Tarmalg




Havssallat




Karragenalg



Bergborsting




Klyving




Grovsläke



Ishavstång




**Blåtonat
rödblod**



Fjäderslick




Tussaskägg




Skräppetare




Sågtång



Blåstång



Slät kalkskorpa



Fingertare



Knöltång



VÄSTERHAVSVECKANS ALGBINGO

1. Tarmalg (*Ulva intestinalis*)

Grönalg. Rörformig upp till 30-50 cm. På grunt vatten längs hela västkusten och upp till Ålands hav. Kan ätas färsk i sallad eller torkas och användas i matlagning.

2. Havssallat (*Ulva lactuca*)

Grönalg. Bladliknande växtsätt upp till 15-20 cm. På grunt vatten längs hela Sveriges kust. Kan ätas färsk i sallad eller torkas och användas som krydda.

3. Karragenalg (*Chondrus crispus*)

Rödalga. Platt stam som upprepat delas upp i nya grenar med broskartad och krusig bål. Upp till 20 cm. Från grunt vatten ner till ca 20 m djup. Används som förtjockningsmedel i livsmedelsindustrin (E-nummer 407). Återfinns längs hela Västkusten.

4. Bergborsting (*Cladophora rupestris*)

Grönalg. Mörkgrön färg. Bildar täta knippen med förgrenade styva trådar. På stenar från grunt vatten ner till 15 m djup. Återfinns längs hela Västkusten upp till Ålands hav.

5. Klyving (*Polyides rotunda*)

Rödalga. Brunröd till röd med gaffelgrenade skott med u-formade grenvinklar. Upp till 25 cm. Från grunt vatten ner till ca 10 m djup. Återfinns längs hela Västkusten upp till Ålands hav.

6. Grovsläke (*Ceramium virgatum*)

Rödalga. Bildar gaffelgreniga buskar med bandade grenar och kloformade grenspetsar. Upp till 15 cm. Återfinns längs hela Västkusten upp till Ålands hav.

7. Ishavstång (*Fucus evanescens*)

Brunalg. Upp till 30 cm hög och gaffelgrenad. Relativt smala grenar som saknar flytblåsor. På våren syns de uppsvällda fortplantningsorganen längst ut på grenspetsarna. På grunt vatten ofta tillsammans med blåstång. Återfinns längs hela Västkusten ner till Öresund.

8. Blåtonat rödblåd (*Phyllophora pseudoceranoides*)

Rödalga. 1-2 mm tjock stam som förgrenas upp i solfjäderliknande blad som är röda till violetta. Från grunt vatten ner till ca 25 m djup. Återfinns längs hela Västkusten upp till Ålands hav.

9. Fjäderslick (*Polysiphonia elongata*)

Rödalga. Kraftig förgrenade buskar som varierar mycket i utseende som är upp till 30 cm höga. Återfinns längs hela Västkusten upp till Ålands hav.

10. Tussaskägg (*Coralina officinalis*)

Rödalga. Ljusröd buske med fjädergrenade skott. Algen lagrar in kalk i grenarna men den är ändå böjlig i lederna. Från grunt vatten ner till 30 m djup. Återfinns längs hela Västkusten.

11. Skräppetare/ Sockertare (*Saccharina latissima*)

Brunalg. Läderartad och avlång, hel bladskiva som blir upp till 2,5 m lång och 30 cm bred. Den runda stammen slutar i ett förgrenat häftorgan. Återfinns längs hela Västkusten och in i Östersjön till Bornholm. Från någon meters djup ner till 30 m. Passar bra till många olika maträtter. Eftersom tillväxten sker vid stammen så är de bästa delarna för tillagning där. Kan kokas eller torkas.

12. Sågtång (*Fucus serratus*)

Brunalg. De ljusa till mörkt brun platta grenarna har sågtandad kant och saknar flytblåsor. Upp till 1 m hög. Från 0,5 m ner till 10 m djup. Återfinns längs hela Västkusten och i Östersjön upp till Gotland. Passar bra att torka och kan användas i många olika maträtter.

13. Blåstång (*Fucus vesiculosus*)

Brunalg. Ljust till mörkt brun med läderartade, plattade grenar med tydlig mittnerv och parvisa gasfyllda blåsor. Fortplantningsorganen sitter i grenspetsarna. Växer på grunt vatten och återfinns längs hela Västkusten upp till Ålands hav. Passar bra att torka och kan användas i många olika maträtter.

14. Slät kalkskorpa (*Phymatolithon lenormandii*)

Rödalga. Lagrar in kalk och växer som en rödviolett tunn skorpa på stenar och hårda ytor. Från grunt vatten ner till 15 m djup. Återfinns längs hela Västkusten och in i Östersjön till Bornholm.

15. Fingertare (*Laminaria digitata*)

Brunalg. Upp till 2 meter stor läderartad bladskiva som delas upp i flikar. Stammen är rund, böjlig och slät och slutar i ett förgrenat häftorgan. Återfinns längs hela Västkusten och i västra Östersjön. Passar bra till många olika maträtter. Eftersom tillväxten sker vid stammen så är de bästa delarna för tillagning där. Kan kokas eller torkas.

16. Knöltång (*Ascophyllum nodosum*)

Brunalg. Olivgrön till gulbrun buske av läderartade och remformade grenar med gasfyllda blåsor och blir 1 m lång. Sitter fast med en kraftig häftskiva. Växer på grunt vatten i skyddade lägen. Återfinns längs hela Västkusten ner till Öresund. Passar bra till många olika maträtter. Tillväxten sker i grenspetsarna och det är dessa delar som passar bäst att äta.